

Recomendaciones

- Se recomienda sembrar **INTA-Dorada** en la zona de occidente, pacífico, centro y costa caribe de Nicaragua.
- Siembre a distancia de 80 a 100 centímetros entre plantas y 100 centímetros entre surcos.
- Realice eliminación de malezas (chapoda) durante los primeros cinco meses de establecido el cultivo para garantizar un buen desarrollo.
- Fertilice en los 30, 60 y 90 días después de la siembra para garantizar un mejor aprovechamiento por la planta.
- Utilice alternativas de fertilización orgánica con alto contenido de fósforo y materia orgánica tales como: Bocashi, compost o bien formula completo comercial.



Escríbanos: oaip@inta.gob.ni

Búsquenos: www.inta.gob.ni

Véanos en 

Hazte Fans en 

Síguenos en 

Visítenos: Contiguo a la Estación V
de la Policía Nacional, Managua.

Telf.: 2278-0471



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria

Variedad de yuca **INTA-Dorada**



La reproducción de este material es financiada por:



Programa Regional de Investigación
e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola





Variedad de Yuca INTA-Dorada

El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, ha adaptado a las condiciones de Nicaragua, durante los años 2005 al 2011, una variedad de yuca proveniente del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la que hemos denominado **INTA-Dorada**.

INTA-Dorada es una variedad con alto contenido nutricional, biofortificada con vitamina A.

Tiene rendimiento promedio de 314 quintales por manzana.

Los productores y productoras pueden seleccionar su semilla para las siguientes siembras.



Características agronómicas

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Tipo de planta | : Compacta |
| 2. Forma de la raíz | : Cónica cilíndrica |
| 3. Color de la cáscara de la raíz | : Amarillo |
| 4. Color de los brotes tiernos | : Verde claro |
| 5. Textura de la piel de la raíz | : Lisa |
| 6. Tolerancia intermedia | : Bacteriosis, Cercóspora, Antracnósis |
| 7. Tiempo de cocción | : 25 minutos |
| 8. Color de la pulpa de la raíz | : Amarillo |
| 9. Promedio de raíces por planta | : 7 a 10 |
| 10. Momento de cosecha | : 10 meses |

